



**Cuestionario de autoevaluación. Preguntas (Selección única)**  
**Las fiebres manchadas y su importancia en Costa Rica**

- 1) Marque la respuesta incorrecta.
  - a) La *Rickettsia rickettsii* es una bacteria cocoide parásito obligatoria.
  - b) Se multiplican por división binaria en el citoplasma de células del vector.
  - c) No pueden transmitirse en forma horizontal entre hospederos.
  - d) En los reservorios artrópodos la transmisión es transovárica.
- 2) Marque la repuesta correcta
  - a) Las células infectadas son las subdérmicas y la transmisión se da localmente
  - b) La enfermedad es autolimitada debiendo esperarse el diagnóstico para iniciar tratamiento.
  - c) Los síntomas iniciales son febriles seguidos de un exantema macular, generalmente acompañados de síntomas digestivos y pulmonares.
  - d) Se descarta el diagnóstico si la lesión se transforma en petequial.
- 3) Marque la respuesta incorrecta.
  - a) El SNC no se afecta en una infección por *Rickettsia rickettsii*.
  - b) El edema y la hipovolemia se deben a un aumento de la permeabilidad vascular.
  - c) La afección hepática acompañada de elevación de enzimas no necesariamente conlleva a falla funcional del órgano.
  - d) La liberación de fosfolipasa D y hemolisina C inhiben la destrucción de *R.rickettsii* fagocitadas.
- 4) Marque la respuesta incorrecta
  - a) El interferón y las células NK pueden inhibir la multiplicación de *R. rickettsii* al inicio de la infección.
  - b) No se forman anticuerpos protectores para la reinfección
  - c) Una prueba de Weil Felix positiva en pacientes sintomáticos es sugestiva de infección por *Rickettsia*.
  - d) No se debe esperar una confirmación diagnóstica con PCR para iniciar el tratamiento.
- 5) Marque la respuesta incorrecta
  - a) El diagnóstico mas específico de *Rickettsia rickettsii* se hace por reacción de polimerasa en cadena.
  - b) Generalmente se obtiene respuesta terapéutica a la antibioticoterapia en las primeras 48 horas del inicio del tratamiento.
  - c) El cloranfenicol nunca debe ser utilizado para el tratamiento de rickettsiosis, debido a sus efectos secundarios.
  - d) La transmisión por garrapatas puede tardarse varias horas desde el momento de su contacto con piel humana.

**Cuadro de llenado**

1	2	3	4	5
a) <input type="radio"/>				
b) <input type="radio"/>				
c) <input type="radio"/>				
d) <input type="radio"/>				

**Datos personales: (llenar en letra imprenta)**

Nombre y apellidos:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Apartado: \_\_\_\_\_

N° código médico \_\_\_\_\_

Domicilio exacto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Especialidad: \_\_\_\_\_

Teléfono: (     ) \_\_\_\_\_

**Enviar esta hoja de respuestas a:**

Revista Acta Médica Costarricense. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Apartado 548-1000 San José, Costa Rica. Tel/fax: (506) 232-3433, ext.143.



## Cuestionario de autoevaluación. Preguntas (Selección única)

### La cicatrización Queloide

- Son causa de cicatrización queloide.
  - Trauma
  - Vacunación
  - Tatuajes
  - Arete lobulo de la oreja.
  - Todas las anteriores.
- En relación a la cicatrización queloide:
  - La cicatrización queloide no recurre en el tiempo a diferencia de la hipertrofica.
  - En Costa Rica existe una consulta propia de queloide, por lo tanto, es muy frecuente esta patología.
  - La radiación inmediatamente después de la cirugía, es una adecuada forma de prevenir la enfermedad.
  - La crioterapia como monoterapia esta indicada en los queloide pequeños.
  - Las recomendaciones de uso para el gel de silicone es de 4 a 6 meses mínimo.
- Con respecto al tratamiento médico quirúrgico, lo siguiente es verdadero
  - La excisión quirúrgica debe considerarse siempre en todo paciente con queloide.
  - La excisión quirúrgica es por hoy el tratamiento de elección.
  - La presoterapia mayor 24mmHg debe ser continua y sostenida por un lapso de 6 meses.
  - El uso de terapia combinada es lo único que ha demostrado ser eficaz.
  - A y B son correctas.
  - C y D son correctas.
- La cicatrización queloide es mas frecuente en:
  - Raza caucásica
  - Personas menores de 10 años y mayores de 50 años.
  - Personas entre los 10 y 30 años de edad.
  - Mujeres que en hombre
  - Todas son incorrectas.
- Son características de la triamcinolona en la cicatrización queloide todas, excepto:
  - Fluorocorticoesteroide 9-Beta.
  - Hace la lesión más blanda, suave y pequeña.
  - Tiene acción prolongada.
  - Alivia el dolor, prurito y ardor.
  - La complicación más frecuente es la atrofia local.

### Cuadro de llenado

1	2	3	4	5
a) <input type="radio"/>				
b) <input type="radio"/>				
c) <input type="radio"/>				
d) <input type="radio"/>				
e) <input type="radio"/>				
		f) <input type="radio"/>		

### Datos personales: (llenar en letra imprenta)

Nombre y apellidos:

---

---

Apartado: \_\_\_\_\_

N° código médico \_\_\_\_\_

Domicilio exacto: \_\_\_\_\_

---

---

Especialidad: \_\_\_\_\_

Teléfono: (     ) \_\_\_\_\_

### Enviar esta hoja de respuestas a:

Revista Acta Médica Costarricense. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Apartado 548-1000 San José, Costa Rica.  
Tel/fax: (506) 232-3433, ext.143.